


## EXPANSIÓN RAPIDA DEL PALADAR

Te hemos colocado un **aparato de ortopedia** maxilar para agrandar tu paladar. Con la expansión de la arcada superior conseguiremos mayor espacio para colocar tus dientes en la posición correcta, obteniendo así una mejor mordida. Un paladar estrecho y profundo se asocia con frecuencia a una mala respiración y a roncar al dormir. Ensanchando el paladar tu respiración nasal mejorará notablemente.

La diferencia entre este tipo de aparato y “los brackets”, es que estos mueven los dientes, mientras que tu aparato de expansión maxilar **actúa sobre los huesos** del paladar, ensanchando, aprovechando la característica anatómica de que el paladar está formado por dos huesos unidos en el centro por una sutura. El expansor separa las dos partes del paladar, después el hueso se vuelve a formar y rellena los espacios y el paladar resultante es mucho más grande.

Este aparato, una vez fijado en boca, tendrá que ser atendido por tus padres, que se encargarán de controlarlo todos los días, procurando efectuar su activación, desplazando dos veces al día el tornillo.



### INDICACIONES DE CÓMO SE ACTIVA EL APARATO DE EXPANSIÓN

LEER CON ATENCION- RESERVADO A LOS PADRES

- La Dra. López de Luzuriaga le entregó una llave con anilla de seguridad azul de plástico.
- Acueste a su hijo en una cama, sillón o sobre una mesa, con buena iluminación y haciendo que abra bien la boca. Introduzca la anilla en el dedo meñique o índice de su mano derecha y sujete la llave.
- Introduzca la llave en el agujero del centro del aparato.
- Empuje la llave en forma progresiva, pero suavemente hasta la parte posterior de la boca de su hijo, cuando llegue al fondo saque la llave, evitando que vuelva hacia atrás.
- Si algo no funciona, pídenos enseguida hora para proceder inmediatamente a su verificación.


ATENCIÓN: para la mayor parte de los pacientes, este proceso no es doloroso en absoluto. De todas formas, se puede apreciar una ligera molestia inicial y una sensación de presión en la base de la nariz, un comprimido de paracetamol será suficiente para aliviar esta molestia.

Como padres tienen que la responsabilidad de:

- Activar el aparato
- Atenerse estrictamente al tratamiento terapéutico y a las instrucciones dadas en la consulta.
- No acelerar ni retrasar el programa establecido por la ortodoncista.
- Asegurarse que el aparato del niño este siempre bien limpio. Esta seguridad la obtendrá con un correcto cepillado y una irrigación bucal.

Un aparato bien limpio previene las irritaciones y funciona mejor.

Cada día se activarán 2 agujeros (preferiblemente 1 cada 12 horas) 1 por la mañana y 1 por la tarde.



Las revisiones en la consulta serán una vez por semana.

Aparecerá una **gran separación** entre los dos incisivos centrales superiores que es el resultado de una buena respuesta de maxilar a la expansión.

Posteriormente cuando dejemos de dar vueltas (aproximadamente a las 3 semanas) y los incisivos se irán **juntando** porque los dientes tienden a moverse hacia donde tienen espacio.